

# Preparación para la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)



 **PRESBYTERIAN**

## ¡IMPORTANTE!

**Por favor lea estas instrucciones una semana antes de su procedimiento.**

Le llevará varios días prepararse para esta prueba. También es posible que tenga que dejar de tomar algunos medicamentos hasta con una semana de antelación. Por favor, lea estas instrucciones con suficiente antelación a la fecha de su procedimiento. Le recomendamos que coloque estas instrucciones en un lugar visible de su casa para recordar los distintos pasos que deberá seguir.

Deberá tomarse el día libre en el trabajo.

**Necesitará que alguien le lleve a casa después de su procedimiento. Usted no puede conducir de vuelta a casa porque se le administrará un sedante.**

Si desea cancelar su cita debe comunicarse con nosotros con 72 horas de antelación a la prueba programada.

**Presbyterian Medical Group  
Gastroenterología**

**(505) 224-7000**

## Responsabilidades del paciente

- Por favor infórmenos antes de su procedimiento si su seguro médico ha cambiado.
- Puede recibir una llamada del departamento de registro de Presbyterian para verificar su información y la cobertura del seguro después de que se le programe su procedimiento. Si tiene preguntas referentes al registro puede llamar al 559-1009.
- Si necesita ayuda financiera debido al costo de su procedimiento, o si tiene preguntas financieras o de cobros, por favor llame al 923-6600.
- Si su seguro exige un referido, este debe estar vigente al momento de su procedimiento, o usted puede ser responsable del pago.
- Recuerde traer su(s) tarjeta(s) de seguro el día de su procedimiento.

### Si está tomando anticoagulantes

- Cinco días antes de su procedimiento, deje de tomar Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Persantine (dipiridamol) o Ticlid (ticlopidina).
- Tres días antes de su procedimiento, deje de tomar Xarelto (rivaroxaban) o Pradaxa (dabigatran etexilate).
- Dos días antes de su procedimiento, deje de tomar Eliquis (apixaban). No deje de tomar estos medicamentos sin haber sido instruido por su cardiólogo, el médico que se los recetó o por la clínica de Coumadin. Comuníquese con el médico que se lo recetó para que le dé instrucciones. Si su médico no quiere que deje de tomar estos medicamentos, por favor comuníquese con nosotros al 224-7000.
- Si es diabético, comuníquese con el médico que le recetó el medicamento para la diabetes para que le dé instrucciones.

**NO** tome los siguientes medicamentos:

- **Alka Seltzer, Pepto Bismol, suplementos de hierro**

### La noche antes de su procedimiento

- No coma ni beba después de medianoche.
- Si tiene un resfriado, fiebre, tos, dolor de garganta o de pecho antes de su cita, comuníquese con nosotros.

### El día de su procedimiento

- Antes de las 6 de la mañana del día de su procedimiento, tome sus medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones.
- Traiga sus inhaladores, lentes para leer y aparatos auditivos si los usa.
- Quítese todas las joyas y deje los objetos de valor en casa.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

## Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

### Lo que debe saber:

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es tanto una prueba como una forma de tratar algunas enfermedades. La palabra "endoscópica" significa que se utiliza un pequeño aparato que permite ver algo dentro del cuerpo. La palabra "retrógrada" significa que va en reversa. "Colangio" es la palabra médica que designa un área en la que los jugos producidos por varios órganos pasan al intestino para ayudar a digerir (descomponer y utilizar) los alimentos. La palabra "pancreatografía" significa tomar una imagen de su páncreas.

Durante una CPRE, se introduce en la boca un tubo delgado con una luz diminuta y una cámara cerca del extremo. El tubo baja por la garganta y llega al esófago. A continuación, el tubo entra en el estómago y llega al intestino delgado. Puede que dentro del tubo que se trague vaya un tubo más pequeño. Este tubo más pequeño es capaz de entrar en las áreas estrechas en las que su proveedor de servicio desea trabajar o examinar.

**La prueba de la CPRE:** La CPRE es una prueba que puede utilizarse para:

- Ver varias zonas de su sistema digestivo. A veces todo lo que su proveedor de servicio necesita es ver la zona para así saber cuál es la causa de su problema abdominal.
- Inyectar un medio de contraste para tomar imágenes.
- Quitar un pequeño trozo de tejido para una biopsia.
- Medir las presiones de los conductos (pequeños tubos por donde pasan los jugos digestivos).

**La CPRE como tratamiento:** La CPRE es un tratamiento que puede utilizarse para:


- Colocar un stent. Un stent es un tubito de plástico o de metal utilizado para mantener abierto un conducto.
- Hacer una abertura para que el jugo digestivo fluya uniformemente desde un conducto.
- Romper y extraer pequeños cálculos que puedan estar obstruyendo los conductos.

### Riesgos:

- Con la CPRE usted puede contraer una infección del sistema digestivo. También puede que le dé pancreatitis (inflamación del páncreas). En raras ocasiones puede sangrar, o se le puede perforar el esófago, el estómago o el intestino. Puede tener dificultad para respirar o dejar de respirar. Podría necesitar una operación para arreglar algunos de estos problemas o que tenga que quedarse hospitalizado a causa de ellos.
- De no hacerse la CPRE es posible que tenga que hacerse otra prueba, lo que también tiene riesgos. Puede necesitar una operación. Las operaciones tienen muchos más riesgos que la CPRE.

Llámenos al 224-7000 si tiene los siguientes síntomas después de su procedimiento:

- Náusea
- Vómitos
- Fiebre
- Escalofríos
- Hemorragia o sangrado
- Dolor abdominal



 **PRESBYTERIAN**

**Presbyterian Medical Group  
Gastroenterología**

**(505) 224-7000**