

Ecografía endoscópica



 **PRESBYTERIAN**

¡IMPORTANTE!

Por favor lea estas instrucciones una semana antes de su procedimiento.

Le llevará varios días prepararse para esta prueba. También es posible que tenga que dejar de tomar algunos medicamentos hasta con una semana de antelación. Por favor, lea estas instrucciones con suficiente antelación a la fecha de su procedimiento. Le recomendamos que coloque estas instrucciones en un lugar visible de su casa para recordar los distintos pasos que deberá seguir.

Deberá tomarse el día libre en el trabajo.

Necesitará que alguien le lleve a casa después de su procedimiento. Usted no puede conducir de vuelta a casa porque se le administrará un sedante.

Si desea cancelar su cita debe comunicarse con nosotros con 72 horas de antelación a la prueba programada.

**Presbyterian Medical Group
Gastroenterología**

(505) 224-7000

Responsabilidades del paciente

- Por favor infórmenos antes de su procedimiento si su seguro médico ha cambiado.
- Puede recibir una llamada del departamento de registro de Presbyterian para verificar su información y la cobertura del seguro después de que se le programe su procedimiento. Si tiene preguntas referentes al registro puede llamar al 559-1009.
- Si necesita ayuda financiera debido al costo de su procedimiento, o si tiene preguntas financieras o de cobros, por favor llame al 923-6600.
- Si su seguro exige un referido, este debe estar vigente al momento de su procedimiento, o usted puede ser responsable del pago.
- Recuerde traer su(s) tarjeta(s) de seguro el día de su procedimiento.

Si está tomando anticoagulantes

- Cinco días antes de su procedimiento, deje de tomar Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Persantine (dipiridamol) o Ticlid (ticlopidina).
- Tres días antes de su procedimiento, deje de tomar Xarelto (rivaroxaban) o Pradaxa (dabigatran etexilate).
- Dos días antes de su procedimiento, deje de tomar Eliquis (apixaban). No deje de tomar estos medicamentos sin haber sido instruido por su cardiólogo, el médico que se los recetó o por la clínica de Coumadin. Comuníquese con el médico que se lo recetó para que le dé instrucciones. Si su médico no quiere que deje de tomar estos medicamentos, por favor comuníquese con nosotros al 224-7000.

NO tome los siguientes medicamentos:

- **Alka Seltzer, Pepto Bismol, suplementos de hierro**

La noche anterior a su procedimiento

- No coma ni beba después de medianoche.
- Si tiene un resfriado, fiebre, tos, dolor de garganta o de pecho antes de su cita, comuníquese con nosotros.

El día de su procedimiento

- Medicamentos para diabéticos: El día de su procedimiento **NO** tome su dosis de la mañana. Si tiene una diabetes complicada, puede ponerse en contacto con su médico de cabecera para recibir instrucciones.
- Antes de las 6 de la mañana del día de su procedimiento, tome sus medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones.
- Traiga sus inhaladores, lentes para leer y aparatos auditivos si los usa.
- Quítese todas las joyas y deje los objetos de valor en casa.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Ecografía endoscópica gastrointestinal superior

Lo que debe saber:


- La ecografía endoscópica gastrointestinal superior es un procedimiento para revisar las diferentes partes del tracto gastrointestinal superior (TGI). El tracto gastrointestinal superior. Esta incluye el esófago, el estómago y el duodeno (primera parte del intestino delgado). La ecografía endoscópica del tracto gastrointestinal superior sirve para ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal superior. Pueden incluirse los tumores, hemorragias, pólipos y divertículos (pequeñas bolsas en la pared intestinal). Este procedimiento también sirve para examinar estructuras cercanas al tubo digestivo, como el páncreas, vías biliares y ganglios linfáticos.
- Para la ecografía endoscópica del tracto gastrointestinal superior, los médicos utilizan un ecoendoscopio para ayudar a ver el tracto gastrointestinal. El ecoendoscopio es un tubo de metal, delgado y flexible (que se puede doblar) con un pequeño transductor (sensor) en la punta. Este transductor funciona mediante un globo lleno de agua que genera ultrasonido (ondas sonoras de alta energía). Cuando el sensor toca una determinada parte del tracto gastrointestinal superior, se ven imágenes en una pantalla parecida a la de un televisor. Algunos ecoendoscopios tienen una cámara diminuta que permite al prestador de servicio tener una visión más clara del órgano examinado mientras ve las imágenes en un monitor. Con la ecografía endoscópica del tracto gastrointestinal superior, se puede diagnosticar afecciones del tracto gastrointestinal y dar tratamiento lo antes posible.

Riesgos:

- La ecografía endoscópica del tracto gastrointestinal superior es un procedimiento seguro, pero también puede causar efectos secundarios desagradables. Es posible que se produzcan hemorragias, latidos anormales del corazón, presión arterial alta o dificultad para respirar. Puede perforarse (desgarrarse) el esófago, el estómago o el duodeno debido al aumento de la presión durante el paso del endoscopio. Puede disminuir la posibilidad de sufrir algún problema si sigue las recomendaciones su prestador de servicio durante y después del procedimiento.
- Sin este procedimiento, su enfermedad podría no ser diagnosticada y no dársele el tratamiento adecuado. Los signos y síntomas que tiene pueden continuar y empeorar. Podría tener problemas para comer, digerir los alimentos o para defecar, dando lugar a otros problemas médicos graves. Consulte con su prestador de servicio si tiene dudas o preocupaciones sobre el procedimiento, los medicamentos o los cuidados.

Llámenos al 224-7000 si tiene los siguientes síntomas después de su procedimiento:

- Náusea
- Vómitos
- Fiebre
- Escalofríos
- Hemorragia o sangrado
- Dolor abdominal



 **PRESBYTERIAN**

**Presbyterian Medical Group
Gastroenterología**

(505) 224-7000