

Preparación del paciente para el sistema de permeabilidad Agile



 **PRESBYTERIAN**

¡IMPORTANTE!

Por favor lea estas instrucciones una semana antes de su procedimiento

Le tomará varios días para prepararse para esta prueba. También es posible tenga que dejar de tomar ciertos medicamentos hasta una semana antes. Le recomendamos que coloque estas instrucciones en un lugar visible de su casa para recordarle de los distintos pasos que debe seguir.

Fecha: _____

Hora: _____

Proveedor: _____

Ubicación: _____

**Presbyterian Medical Group
Gastroenterology**

(505) 224-7000

Responsabilidad del paciente

- Si hay algún cambio con su(s) seguro(s), por favor notifíquelo a nuestra oficina antes de su fecha de procedimiento.
- Si su seguro requiere una referencia, debe de estar vigente en el momento de su procedimiento, o usted podría ser responsable del pago.
- Recuerde de traer consigo su(s) tarjeta(s) de seguro el día de su procedimiento.

El día antes de su cápsula permeabilidad

- Termine su almuerzo a mediodía. Después del almuerzo, **NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO.**
 - **Beba solo líquidos transparentes** durante el resto del día y para la cena. Consulte la lista de líquidos transparentes permitidos en el reverso de esta página.
- Continúe la dieta líquida el resto del día.
- Puede tomar todos los medicamentos que estén programados para en la noche.
- **No coma ni beba nada después de las 10 de la noche.**

El día de su procedimiento

- A las 6 de la mañana el día de su procedimiento, por favor tome sus medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones.
- Tome cualquier medicamento que tenga programado por la mañana con un pequeño trago de agua. Deberá tomar todos los medicamentos al menos dos horas antes de la hora de su cita.
- Cuando llegue a la clínica, usted firmara un formulario de consentimiento para el procedimiento. Después, la enfermera le pedirá que ingiera la cápsula con un vaso pequeño de agua.

- Dos horas después de ingerir la capsula, usted puede beber líquidos transparentes.
- Después de cuatro horas, puede consumir un refrigerio ligero.
- Después de 6 horas, podrá reanudar su dieta normal.

El día después de su ingesta de la cápsula de permeabilidad

- Vaya para que le realicen una radiografía en cualquier ubicación de la lista que le proporcionaron entre las horas de las 1:00 y 2:00 de la tarde, para identificar la ubicación de la cápsula. No necesita una cita.

La clínica se comunicará con usted para darle instrucciones de seguimiento según los resultados.

Dieta de líquidos transparentes

A partir del mediodía del día antes de su prueba, usted solamente puede beber o comer productos en esta lista.

- Agua
- Café (sin leche o crema; sí se permite el azúcar)
- Té (sin leche o crema; sí se permite el azúcar)
- Bebidas carbonatadas (refrescos - normales o sin azúcar)
- Jugo de manzana
- Jugo de uva blanca
- Gatorade (no de color rojo, morado, o anaranjado)
- Limonada de limón (sin pulpa)
- Limonada de lima (sin pulpa)
- Caldo transparente de pollo o res (sin carne verduras, fideos ni arroz)
- Consomé
- Consomé transparente
- Conos (raspados) de hielo o paletas (no de color rojo, morado o anaranjado)
- Caramelos duros
- Gelatina (no de color rojo, morado, o amajadado. Preferimos que solo consuma colores claros como amarillo o rosa.)
- **¡EL ALCOHOL NO ESTÁ PERMITIDO!**

Llame a nuestra consultorio al (505) 224-7000 si presenta los siguientes síntomas:

- Dolor abdominal
- Náuseas
- Vómitos
- Distensión abdominal



Presbyterian Medical Group
Gastroenterology

(505) 224-7000