

Cómo se deben preparar los pacientes para el sistema de *agile patency* [permeabilidad ágil]



¡IMPORTANTE! Sírvase leer estas instrucciones una semana antes de su procedimiento

Le llevará varios días prepararse para esta prueba. Tal vez usted deberá dejar de tomar ciertas medicinas con hasta una semana de antelación. Sírvase leer estas instrucciones con suficiente antelación a la fecha programada para su procedimiento.

Recomendamos que usted ponga estas instrucciones en un lugar visible en su casa para recordarle los diversos pasos que usted deberá seguir.

Fecha: _____

Hora: _____

Proveedor de servicios clínicos:

Lugar: _____

División de Gastroenterología del Presbyterian Medical Group

(505) 224-7000

Las responsabilidades de los pacientes

- Si ha habido algún cambio a su(s) seguro(s), sírvase avisar al personal de nuestro consultorio antes de la fecha del procedimiento.
- Si su seguro requiere una remisión médica, debe estar en vigor dicha remisión en el momento de su procedimiento; de lo contrario, quizás a usted le corresponderá pagar.
- No deje de traer su(s) tarjeta(s) de seguro(s) el día de su procedimiento.

El día antes de tomar su cápsula de *patency*

- Termine el almuerzo antes del mediodía. Después de almorzar **NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO.**
- **Tome sólo líquidos transparentes** por el resto del día y para la cena. Consulte la lista de los líquidos transparentes aceptables que se encuentra al dorso de esta página.
- Siga con la dieta líquida el resto del día.
- Usted puede tomar todo medicamento necesario que tome de ordinario por la noche.
- **No coma ni beba nada después de las 10:00 de la noche.**

El día de su procedimiento

- Tome sus medicinas del corazón y para controlar la presión arterial y los ataques de convulsiones antes de las 6:00 de la mañana el día de su procedimiento.
- Tome todo medicamento que sea necesario en la mañana con un trago pequeño de agua. Usted debe tomar todos los medicamentos por lo menos dos horas antes de la hora de la cita.
- Cuando llegue a la clínica, usted firmará un formulario de consentimiento para el procedimiento. Luego, el(la) enfermero(a) le dará la cápsula para que la trague con una taza pequeña de agua.
- Dos (2) horas después de tomar la cápsula, usted puede beber agua.
- Después de cuatro (4) horas, usted puede comer una merienda ligera.
- Después de seis (6) horas, usted puede volver a su dieta normal.

SE CONTINÚA AL DORSO

□ El día después de que usted ingiera la cápsula de patency

- **Vuelva a la clínica a las 2:30 de la tarde el día después de que usted ingiera la cápsula.** El(La) enfermero(a) utilizará un ecógrafo para verificar que se haya pasado y salido de su cuerpo la cápsula. Luego se le programará la endoscopia con cápsula.
- Si el ecógrafo indica que todavía no se ha excretado la cápsula, se requiere que se haga una radiografía para identificar el sitio dónde se encuentra la cápsula. Se le darán instrucciones a seguir, provenientes de los resultados de la radiografía.

Dieta de líquidos transparentes

A partir del mediodía del día antes de su prueba, usted sólo debe tomar o comer lo que se indica en la lista siguiente.

- Agua
- Café (sin leche o crema; se permite tomar con azúcar)
- Té (sin leche o crema; se permite tomar con azúcar)
- Bebidas gaseosas (refrescos, ya sean regulares o sin azúcar)
- Jugo de manzana
- Jugo de uva blanca
- Gatorade (con tal que no sea de color rojo, morado o anaranjado)
- Limonada de limones (sin pulpa)
- Limonada de limas verdes (sin pulpa)
- Caldo transparente de pollo o res (sin carne, vegetales, fideos, arroz)
- Caldo hecho de cubitos
- Consumé transparente
- Hielo raspado con almíbar dulce o paletas sin crema (con tal que no sean de color rojo, morado o anaranjado)
- Caramelos duros
- Gelatina *Jell-O* (con tal que no sea de color rojo, morado o anaranjado. Preferimos que sólo la coma de colores más claros, por ejemplo, amarillo o rosado.)
- **¡NO SE PERMITE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES!**

Llame al personal de nuestro consultorio al 224-7000 si usted tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación:

- Dolores abdominales
- Náuseas
- Vómitos
- Distensión abdominal



División de
Gastroenterología del
Presbyterian Medical Group

(505) 224-7000