

Preparación para rectosigmoidoscopia



 **PRESBYTERIAN**

¡IMPORTANTE! Por favor lea estas instrucciones una semana antes de su procedimiento.

Por favor, lea estas instrucciones con suficiente antelación a la fecha de su procedimiento. Le recomendamos que coloque estas instrucciones en un lugar visible de su casa para recordar los distintos pasos que deberá seguir.

Si desea cancelar su cita debe comunicarse con nosotros con 72 horas de antelación a la prueba programada.

Llámenos al 224-7000 si tiene los siguientes síntomas después de su procedimiento:

- Náusea
- Vómitos
- Fiebre
- Escalofríos
- Hemorragia o sangrado
- Dolor abdominal

**Presbyterian Medical Group
Gastroenterología
(505) 224-7000**

Responsabilidades del paciente

- Por favor infórmenos antes de su procedimiento si su seguro médico ha cambiado.
- Si su seguro exige un referido, este debe estar vigente al momento de su procedimiento, o usted puede ser responsable del pago.
- Recuerde traer su(s) tarjeta(s) de seguro el día de su procedimiento.

Por favor infórmenos si está tomando anticoagulantes como Coumadin o Plavix

Compras

- Necesita comprar dos enemas Fleet, están disponible de venta libre. No necesita una receta para comprarlas.

El día de su rectosigmoidoscopia

- No coma ni beba nada después de medianoche.
- Antes de las 6 de la mañana del día de su procedimiento, tome sus medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones.
- Póngase el primer enema **dos horas** antes de su cita a las _____.
- Póngase el segundo enema **una hora** antes de su cita a las _____.

Fecha: _____

Hora: _____

Proveedor: _____

Ubicación: _____